



PARCHI E RISERVE NATURALI DEL LAGO MAGGIORE

IX CONVEGNO NAZIONALE INANELLATORI - PESCARA 28-29 GENNAIO 2006

“Nuove” notizie sullo status della Cinciarella (*Parus caeruleus*)

Marco Bandini, Caterina Mervic, Renato Orlandi

disegni: Marta Barbieri

L'area di studio, sulla sponda occidentale del Lago Maggiore, è localizzata all'interno della Riserva naturale speciale di Fondotoce:

- Regione: Piemonte, Provincia: Verbano-Cusio-Ossola, Comune: Verbania;
- altitudine: 295 s.l.m. - coordinate geografiche: 45,56°N, 8,30°E

La Riserva è stata istituita nel 1990 e, fino all'anno 2000, le attività di inanellamento sono state effettuate nei mesi di febbraio-marzo e ottobre-novembre utilizzando, quale mezzo di cattura, un impianto di “mist-nets” di 200 metri ai lati del canneto, esteso per circa 30 ettari, e dominato da Cannuccia di palude (*Phragmites australis*).

Nell'ambito di un progetto Interreg, nel 2001 è stata realizzata, all'interno del canneto, una passerella galleggiante di 300 metri su cui posizionare le reti. Dal 2001 al 2005 le operazioni di cattura si sono svolte continuamente nei periodi aprile-maggio e agosto-ottobre. Inoltre nei mesi di giugno e luglio si sono tenute sessioni di cattura mirate al monitoraggio dell'avifauna nidificante.


La stazione partecipa al Progetto Alpi, coordinato dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e dal Museo Tridentino di Scienze Naturali.



Nel quinquennio 2001-2005, sono stati catturati complessivamente 1.121 esemplari di Cinciarella (*Parus caeruleus*) così suddivisi: 738 catture, 2 ricatture esterne e 371 controlli.


Il grafico a fianco mostra l'andamento delle catture nel corso dell'anno diviso per decenni.

La specie è presente tutto l'anno, nidifica ed è comunemente distribuita sia all'interno della Riserva che nel territorio circostante. Nei mesi autunnali di settembre e ottobre si assiste ad un incremento di individui in transito nell'area, a cui non corrisponde un aumento degli esemplari svemanti in loco; in primavera il fenomeno è molto più contenuto, sia dal punto di vista numerico che temporale, e si colloca nella prima quindicina del mese di febbraio.



Nell'autunno del 2005 a Fondotoce si è assistito ad un notevole aumento delle catture di Cinciarella; il grafico seguente mostra il numero di uccelli inanellati nel quinquennio 2001-2005.

In modo evidente si riscontra che il valore dell'ultimo anno è circa il triplo di quelli dei quattro anni precedenti.



Non è che la Cinciarella sia una delle specie più ambite dall'inanellatore (pensiamo di esprimere in questo modo un comune sentire) nel senso che, potendo scegliere, ciascuno di noi quando si appresta a fare il controllo delle reti, si augura di trovare specie “più interessanti” e “meno problematiche”; è infatti risaputo che la Cinciarella, pur non essendo combattiva come altre specie quali le averle, non ha un caratterino facile facile.



Nel giro di controllo alle reti delle ore 10 del 24 ottobre 2005, insieme a poche altre catture, c'era anche una “ennesima” ricattura di Cinciarella; la lettura dell'anello però ci ha riservato una sorpresa, talmente poco credibile che chi stava compilando le schede di campo, prima di scrivere il dato, ha voluto controllare di persona l'anello: VT59062 Mus. Zool. Lithuania. Inoltre, al momento di inserire i dati nel programma Nisoria, ci siamo “trovati” una Cinciarella ricatturata il 13 settembre che non era nostra ma proveniente, sembra, dal Cuneese.



primavera età 5

Naturalmente queste ricatture non aprono nuove finestre nel mondo dell'ornitologia; a ben guardare infatti in bibliografia la Cinciarella viene così descritta: “normalmente residente, sebbene la maggior parte delle popolazioni nordiche mostrino irregolari esplosioni demografiche e movimenti, generalmente in direzione sud-occidentale”.

Grazie all'attività di inanellamento sono conosciuti movimenti delle popolazioni fennoscandiche e baltiche verso Germania, Belgio e Francia; per le popolazioni russe dell'area nord-occidentale si sono avute ricatture in Spagna (Logroño, 2.200 km), Italia (Venezia, 1.200 km) e Francia (1.270 km). [STANLEY CRAMP, K. E. L. SIMMONS, C. M. PERRINS (1977-1994) Handbook of the Birds of Europe the Middle East and North Africa, (Oxford University Press); D. W. SNOW & C. M. PERRINS (1998) The Birds of the Western Palearctic, Concise Edition (Oxford University Press)].

Se ne deduce che il dato della Cinciarella lituana catturata a Fondotoce non rappresenta una novità e neanche un record di distanza ma sicuramente ribadisce l'importanza di porre la dovuta attenzione e riconoscere le legittime aspirazioni anche per quelle specie da noi ritenute più comuni e “poco significative”.



autunno, età 3 juv



autunno, età 3 e 3 juv

